

LANCASTER RETINA SPECIALISTS, PC
2150 HARRISBURG PIKE, SUITE 370
LANCASTER, PA 17601-2644

Phone: 717-399-8790 Fax: 717-399-3279

Roy D. Brod, M.D.
Lili G. Kaplan, M.D.
Rupak K. Bhuyan, M.D.

Dina Y. Gewaily, M.D., M.S.
Philip H. Scharper, M.D., J.D.

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE LA INYECCIÓN EN EL OCULAR

El ojo puede sentirse ligeramente irritado y arenoso después de la inyección. Esto puede aliviarse usando gotas de lágrimas artificiales de venta libre con la frecuencia necesaria.

Puede haber una mancha roja en la parte blanca del ojo después de la inyección. A veces, esta mancha se extenderá y se hará más grande, y el ojo se verá inyectado en sangre. Generalmente, desaparece en unos días o una semana, pero a veces puede tardar más tiempo, especialmente si está tomando anticoagulantes. La sangre está afuera, no dentro del ojo. No afectará su visión y desaparecerá.

Es posible que note moscas volantes después de la inyección. Las moscas volantes oscuras y perfectamente redondas se deben a las burbujas en el medicamento y generalmente desaparecen en uno o dos días. A veces, quedan pequeñas burbujas y pueden quedar algunas burbujas flotantes mucho tiempo después de la inyección. Son inofensivas.

La visión puede estar un poco borrosa durante algunas horas después de la inyección, pero debería volver a ser como antes de la inyección al día siguiente. A medida que el medicamento comience a hacer efecto, es posible que note una mejoría gradual en su visión. Esto dependerá de su afección ocular subyacente.

SÍNTOMAS QUE DEBE INFORMAR A SU MÉDICO

1. Dolor o malestar que empeora después de la inyección y no se alivia con las lágrimas.
2. Visión borrosa que continúa empeorando y no mejora.
3. Muchas moscas volantes, hilos o una neblina oscura o sombra en su visión que no estaban allí inmediatamente después de la inyección.

*Evite entornos sucios y polvorientos, nadar, que le entre agua en los ojos o usar lentes de contacto durante 24 horas después de la inyección.